

CLÉ GÉNÉRALE DES TYPES DE STATION

STATIONS DE PLATEAU ET VERSANT

Test botanique

N° du type de station

| | | | |
|--|---|--|---|
| Charme toujours absent | <ul style="list-style-type: none"> • Végétation très couvrante dominée par la Molinie bleue et la Bourdaine. Parfois : Peucedan de France, Potentille dressée, Callune, Bruyère cendrée. Le plus souvent, peuplement pauvre de Chêne sessile et Bouleau verruqueux. Sol engorgé une grande partie de l'année. | | → 1 P. 22 |
| Charme à l'état dilué | <ul style="list-style-type: none"> • Végétation dominée par la Molinie bleue et la Bourdaine. Parfois : Canche flexueuse, Laïche à pilules. Le plus souvent, peuplement pauvre de Chêne sessile et Bouleau verruqueux. Sol engorgé une partie de l'année. | | → 2 P. 24 |
| Charme absent ou à l'état dilué | <ul style="list-style-type: none"> • Végétation herbacée peu diversifiée dominée par la Canche flexueuse, Fougère aigle, Chèvrefeuille des bois, Luzule des bois, Houlque molle, Mélampyre des prés, Germandrée scorodoine, Polytric élégant. Présence localement de Callune, Bruyère cendrée, Leucobryum glauque, Dicranum scoparium. Peuplement souvent pauvre et clair à base de Chêne sessile, Bouleau verruqueux, quelquefois Chêne pédonculé. | Sondage à la tarière pour déterminer un degré d'hydromorphie | Résultat jaune → 3 P. 26 Résultat vert → 4 P. 28 |
| Charme abondant et vigoureux | <ul style="list-style-type: none"> • Végétation à recouvrement le plus souvent inexistant ou très faible, composée de Luzule poilue, Chèvrefeuille des bois, Ronce commune, Canche flexueuse et Fougère aigle à l'état dilué. Présence localement de Noisetier, Muguet, Circée de Paris, Canche cespiteuse, Oxalis, Fougère femelle, Fougère spinuleuse, Lierre terrestre. • Végétation arbustive et herbacée riche et diversifiée : Noisetier, Aubépine, Rosier des champs, Fougère mâle. Parfois : Viorne obier, Sceau de Salomon, Pervenche, Primevère élevée, Lamier jaune, Anémone des bois, Euphorbes, Géranium herbe à Robert, Potentille faux fraisier, Véronique petit chêne, Stellaire holostée, Violette des bois. Peuplement dominé par : Chêne pédonculé, Frêne, Merisier, Tremble. Sol frais toute l'année. | Sondage à la tarière pour déterminer un degré d'hydromorphie | Résultat jaune → 5 P. 30 Résultat vert → 6 P. 32 → 7 P. 34 |

STATIONS DE FONDS DE VALLON

| | |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Chêne pédonculé, Frêne, Charme. Grande richesse floristique. Eau à faible profondeur toute l'année. Sol sableux, faiblement acide. | → 8 P. 36 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aulne glutineux dominant ou abondant accompagné du Chêne pédonculé, du Charme, du Frêne. Présence du Bouleau, Tremble. Tapis dense de Molinie bleue, Sphaignes. Engorgement presque constant. Sol argileux, acide. | → 9 P. 37 |

Cette clé simplifiée, dans laquelle vous progressez de gauche à droite, vous permet de déterminer le numéro du type de station de votre terrain. Vous vous reportez ensuite à la fiche descriptive correspondante.

Nom des stations selon Thérèse BEAUFILS, Catalogue des types de stations de Sologne bourbonnaise, 1989.

- 1 : Chênaie hydromorphe (acide)
- 2 : Chênaie hydromorphe (faiblement acide)
- 3 : Chênaie acidiphile (sèche)
- 4 : Chênaie acidiphile (fraîche)
- 5 : Chênaie acidiline (sèche)
- 6 : Chênaie acidiline (fraîche)
- 7 : Chênaie méso-neutrophile (fraîche)
- 8 : Aulnaie-frênaie (humide et faiblement acide)
- 9 : Aulnaie (très humide et acide)